KOLONOSKOPIA – PRZYGOTOWANIE Z PREPARATEM MOVIPREP

Trzy dni przed badaniem: nie należy spożywać pieczywa z ziarnami, owoców pestkowych (np. winogrona, pomidory, kiwi, truskawki), nasion siemienia lnianego, maku, sezamu. Pestki i nasiona zalegające w jelicie utrudnią wykonanie badania.
W dniu poprzedzającym badanie śniadanie powinno być lekkostrawne np. bułka lub kromka chleba z masłem, z serem, jajkiem na twardo, plastrem wędliny, dowolna ilość wody, herbaty, kawy bez fusów (czarnej lub z mlekiem), klarownego soku. Ok. godz. 13.00-15.00 można zjeść zupę typu krem lub przecedzony bulion. Od godz. 15.00 nie należy spożywać już żadnych posiłków. Napoje niegazowane można pić w dowolnej ilości
W dniu badania: Nie należy spożywać żadnych posiłków. Można pić dowolną ilość niegazowanych napojów np. woda, herbata do 2 godz. przed wyznaczoną godziną badania.

UWAGA!
Jeżeli badanie jest wykonane w znieczuleniu, wówczas można pić wodę tylko do optymalnie 6 godzin przed badaniem.

PRZYJĘCIE PREPARATU MOVIPREP
W przeddzień badania: Opakowanie zawiera po dwie saszetki A i B. Wieczorem, w dniu poprzedzającym badanie, do załączonego pojemnika należy wsypać zawartość jednej torebki A i jednej torebki B. Dolać wodę do pojemnika do poziomu górnej kreski (1 l). Wymieszać całość aż płyn będzie prawie całkowicie przejrzysty – może to potrwać kilka minut. Przed wypiciem można schłodzić roztwór. Wypić roztwór w tempie 1 szklanka co 10-15 minut. Ważne! Dodatkowo należy wypić 2 szklanki wody (łącznie 0,5 l) w czasie 30 minut.
W dniu badania: Powtórzyć wszystkie powyższe czynności dla drugiej dawki leku zaczynając picie roztworu na 4 godz. przed planowaną godziną kolonoskopii. Od zakończenia przyjmowania drugiej dawki leku do rozpoczęcia badania powinna minąć co najmniej godzina.

UWAGA!

1. Osoby z chorobami wymagającymi stałego, regularnego przyjmowania leków (np. nadciśnienie tętnicze, choroby serca, padaczka i inne) w dniu badania powinny zażyć poranną dawkę leku popijając niewielką ilością wody).
2. Osoby chorujące na cukrzycę powinny dodatkowo skonsultować z lekarzem sposób przygotowania do badania.
3. Osoby przyjmujące leki obniżające krzepliwość krwi (np. Acenocumarol, Sintrom, Ticlid lub Aspiryna, Acard, Acesan i inne) powinny przerwać ich stosowanie na 7 dni przed badaniem-należy to jednak wcześniej skonsultować z lekarzem prowadzącym. Konieczna może być zamiana tych leków na Heparynę niskocząsteczkową (np. Fraxiparyna, Clexane).Informacja o kontynuacji leczenia p/krzepliwego po zabiegu będzie zawarta w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego.
4. Kobiety ciężarne i matki karmiące piersią powinny skonsultować z lekarzem sposób przygotowania do badania.
5. Wyznaczona godzina badania może ulec przesunięciu ponieważ czas trwania kolonoskopii jest trudny do przewidzenia.

Na badanie zgłoś się z dokumentem tożsamości i skierowaniem. Jeżeli lekarz kierujący lub anestezjolog zalecił wykonanie pewnych badań przed kolonoskopią, pamiętaj o zabraniu wyników tych badań.